ADMINISTRATION DE L'ENVIRONNEMENT
Division Air/Bruit
Service contrôle de la qualité de l'air

PCDD/PCDF accumulées par les CHOUX FRISÉS (pg ITEQ/g de poids sec)

Situation suivie jusqu'au 12 décembre 2003	Campagne d'analyse (numéro et période d'exposition)		
Site d'exposition	**C XIV 4 oct. - 10 déc. 2002**	C XV 21 mai - 09 juil. 2003	**C XVI 30 sep. - 12 déc. 2003**
Rodange-Fontaine d'Olière	1.1	0.2	0.6
Rodange-Route de Longwy	1.0		0.7
Differdange-Cité S. Thomas	1.3	0.2	0.7
idem mais échantillon lavé			0.8
Differdange-Rue des Jardins	1.6	0.2	0.9
idem mais échantillon lavé			**1.0**
Esch/Alzette-An Elsebrech	1.6	0.2	1.5
idem mais échantillon lavé	**1.4**		**1.3**
Esch/Alzette-Rue d'Ehlerange	1.4	0.2	1.4
idem mais échantillon lavé	**1.4**		**1.3**
Esch/Alzette-Wobrecken-Rue Jean Berg	2.1	0.2	0.7
Esch/Alzette-Uecht-Rue du Nord	4.0	0.2	1.0
Esch/Alzette-Lallange-Rue Nicolas Mannes	1.5	0.2	0.8
idem mais échantillon lavé			**0.8**
Schifflange-Cité Um Benn	10.9	0.3	4.1
idem mais échantillon lavé	**11.2**		**3.4**
Schifflange-Rue du Moulin	4.1	0.2	1.1
idem mais échantillon lavé	**3.8**		**1.2**
Leudelange-SIDOR	1.1	0.2	0.4
Osweiler	1.0	0.2	0.5
Beckerich	1.0	0.2	0.4
Nospelt		0.2	0.5
		pas analysé	

Référence chou vert à feuilles polylobées (Brassica oleracea) :	
Seuil sanitaire d'intervention à appliquer à des légumes lavés, destinés à la consommation humaine. Au-dessus de cette valeur, il est recommandé de renoncer à leur consommation.	**10**
Seuil sanitaire préventif à appliquer à des légumes lavés, destinés à la consommation humaine. En-dessous de cette valeur, leur consommation n'est pas problématique.	**3**
Référence zones rurales	**0.5**

Réseau de biosurveillance - Niveaux de dioxines et de furannes détectés par bioaccumulation dans les choux verts à feuilles polylobées.